

Fondazione Ospedale Caimi ONLUS

26019 VAILATE (Cremona) - Via Caimi, 21

Tel. 0363-84020 – Fax 0363-340373

E-mail: caimi@fondazionecaimi.it

P.I. 00305030199

Aggiornato a Marzo 2024

ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'UNITA' DI CURE INTERMEDIE RESIDENZIALI DELLA NOSTRA FONDAZIONE DAL DOMICILIO

Per l'ammissione di un Ospite proveniente dal domicilio nel suddetto reparto:

1. FAR COMPILARE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, IL MODELLO PER IL RICOVERO RILASCIATO DALL'UFFICIO RICOVERI DELL'OSPEDALE CAIMI. RICHIEDETE SE NON POSSIBILE IL RITIRO, L'INVIO VIA MAIL DEL MODULO.
2. UNITAMENTE AL MODELLO RELATIVO ALLA SITUAZIONE DELL'OSPITE SOPRA DESCRITTO E' NECESSARIA L'IMPEGNATIVA MEDICO DI MEDICINA GENERALE RECANTE LA DICITURA:

“Si richiede ricovero in reparto di Cure Intermedie Residenziali per (scrivere la diagnosi principale)”

3. CONSEGNARE IL MODELLO DI CUI AL PUNTO 1, L'IMPEGNATIVA DI CUI AL PUNTO 2 E LA FOTOCOPIA DI:
 - a. Tessera sanitaria nella versione C.R.S. Regionale
 - b. Tessera esenzione dal ticket (per chi ne fruisce)
 - c. Carta d'Identità

DEL PAZIENTE DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO RICOVERI DELLA FONDAZIONE OSPEDALE CAIMI ONLUS IN VIA CAIMI N. 21 A VAILATE (CR): aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 17:30 e il Sabato dalle 8:30 alle 11:30, oppure via mail a CAIMI@FONDAZIONECAIMI.IT

4. SUCCESSIVAMENTE L'UFFICIO RICOVERI VI CONTATTERA' NON APPENA SARA' DISPONIBILE IL POSTO LETTO E SI POTRA' PROGRAMMARE IL RICOVERO PREVIA ESECUZIONE DI TAMPONE ANTIGENICO PER SARS-CoV- 2.

N.B. LA SUDETTA PROCEDURA E' VALIDA SOLO PER I PAZIENTI RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA. PER GLI OSPITI RESIDENTI FUORI REGIONE PRENDERE CONTATTO E ISTRUZIONI DAL NOSTRO UFFICIO RICOVERI.



Regione Lombardia

SCHEDA UNICA DI INVIO E VALUTAZIONE PER RICOVERO IN UNITÀ DI CURE INTERMEDIE

Cognome e Nome Data Nascita Sesso M / F

Domicilio (indirizzo abitazione o struttura residenziale) telefono

Residente in Lombardia: No / Si Invalidità: No Si In corso
 Cittadino Extra UE: No / Si Accompagnamento: No Si In corso

Inviante
 Ospedale telefono
 Reparto
 Referente
 Altro (Riportare nominativo e qualifica medico med. gen., medico RSA, medico specialista, ecc.) telefono

Caregiver/persona di riferimento telefono

Amministratore di sostegno Non necessario No Si telefono

Nominativo.....

Costituiscono criteri di esclusione per il ricovero in unità di cure intermedie:
 - paziente instabile secondo la classificazione della scala SIC (punteggio 3)
 - paziente con acuzie non risolta
 - percorso diagnostico incompleto o in corso di definizione
 - paziente con patologia psichiatrica attiva
 - paziente con condizione per cui sono previsti interventi specifici (SV, SLA, hospice)

AREA CLINICA VALUTAZIONE DI INSTABILITÀ CLINICA (SCALA SIC)

- 0 STABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio M-MI/S programmabile, anche bisettimanale
- 1 MODERATAMENTE STABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio M-MI/S programmabile una o più volte la settimana ma non quotidiano
- 2 MODERATAMENTE INSTABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio M-MI/S routinario una volta al giorno
- 3 INSTABILE: problemi clinici che necessitano di monitoraggio M-MI/S semi-intensivo quotidiano (almeno un altro accesso oltre quello previsto di routine)

Legenda: M – MI/S: Monitoraggio medico e/o infermieristico strumentale = visita medica completa o valutazione attenta "problema-orientata" e/o esami di laboratorio e/o strumentali

EVENTO INDICE (evento che ha determinato il ricovero in ospedale da cui deve essere dimesso con una diagnosi oppure evento al domicilio che determina una recente modifica dello stato clinico-assistenziale-funzionale entrambi passibili o meno di ripristino clinico-funzionale)

.....

Data evento indice se individuabile:.....

Altrimenti specificare il periodo: meno di 3 mesi meno di 6 mesi meno di un anno

Mezzo di sintesi (se posizionato un mezzo di sintesi specificarne il tipo/materiale per possibili incompatibilità in indagini radiologiche o terapie)



CONDIZIONE FUNZIONALE PRE-MORBOSA (RANKIN MODIFICATA)
RIFERITA ALLA CONDIZIONE PREDELENTE L'EVENTO INDICE

- 0 Nessun sintomo**
- 1 Non disabilità significativa:** nonostante la presenza di sintomi era in grado di svolgere tutte le attività (IADL e BADL) ed i compiti abituali
- 2 Disabilità lieve:** non in grado di eseguire tutte le IADL quotidiane ma autonomo nelle BADL, senza bisogno di supervisione o aiuto
- 3 Disabilità moderata:** richiedeva supervisione/aiuto nelle BADL, ma era in grado di deambulare senza assistenza
- 4 Disabilità moderatamente grave:** era incapace di deambulare e provvedere alle BADL senza assistenza
- 5 Disabilità grave:** allettato, incontinente, richiedeva assistenza continua

IADL: usare il telefono, fare la spesa, preparare i pasti, cura della casa, fare il bucato, spostarsi fuori casa, assunzione dei farmaci, uso del denaro

BADL: alimentazione, igiene personale, abbigliamento, bagno-doccia, continenza, uso del gabinetto, trasferimenti, deambulazione

Comorbidità significativa (patologie "attive", ovvero in corso di trattamento anche farmacologico e/o monitoraggio, associate al motivo di ingresso)

.....

.....

.....

.....

CONDIZIONI GENERALI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Controllo del tronco (con riferimento al trunk control test):**
 - nessun controllo (TCT = 0)
 - in grado di girarsi senza supporto su almeno un lato (TCT <25)
 - capace di mantenersi seduto per almeno 30 secondi con supporto (TCT < 50)
 - capace di mantenersi seduto per almeno 30 secondi senza supporto (TCT > 50)
 - buon controllo

• Passaggi posturali:	<input type="checkbox"/> indipendente	<input type="checkbox"/> con aiuto	<input type="checkbox"/> dipendente
• Utilizza ausili per la deambulazione:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Se si, quali?
• Verticalizzazione:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
• Carico concesso:	<input type="checkbox"/> completo	<input type="checkbox"/> parziale	<input type="checkbox"/> assente
• Se in ossigenoterapia, in atto svezzamento:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
• Se in ventilazione meccanica, in atto svezzamento:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
• Se cannula tracheale, in atto rimozione:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Stato Nutrizionale: ADEGUATO OBESITA' MALNUTRIZIONE **Peso Kg:**

TERAPIA FARMACOLOGICA IN CORSO (indicare il farmaco in uso e la posologia)

- | | |
|----------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |

Eventuali farmaci con piano terapeutico:

.....



Regione Lombardia

TERAPIE IN CORSO

<input type="checkbox"/> Assenza di terapie	1
<input type="checkbox"/> Terapia solo orale	2
<input type="checkbox"/> Trattamento infusivo	3
<input type="checkbox"/> Nutrizione parenterale totale	3
<input type="checkbox"/> Trattamento dialitico attivo	3

ALTRI BISOGNI CLINICI

<input type="checkbox"/> Assenza di altri bisogni clinici	1
<input type="checkbox"/> Monitoraggio ematochimici standard	2
<input type="checkbox"/> Monitoraggio ematochimici almeno settimanali	3
<input type="checkbox"/> Necessità di follow-up strumentale	3
<input type="checkbox"/> Necessità di consulenze specialistiche	3

SCALA DI DISABILITÀ COMUNICATIVA

- 4 Nessuna:** riferisce l'anamnesi in maniera attendibile ed è in grado di discutere di tutti i problemi personali. Ben rapportato all'interlocutore e collabora senza problemi alla visita e alle manovre assistenziali
- 3 Lieve:** va "guidato" per ricostruire l'anamnesi e stimolato per parlare dei problemi personali. Adeguato all'interlocutore ma è necessario assumere un atteggiamento "direttivo" per ottenere una buona collaborazione alla visita e alle manovre assistenziali
- 2 Moderata:** possono essere scambiate informazioni solo ponendo al paziente domande semplici e per contesto comunicativo strettamente personale ed attuale. Adeguato all'interlocutore ma non riesce a fornire una buona collaborazione alla visita e alle manovre assistenziali
- 1 Grave:** la comunicazione è molto compromessa e si ottengono informazioni solo con domande che prevedono risposte sì/no e fornendo facilitazioni contestuali e gestuali. Perplesso nel rapporto con l'interlocutore e non collabora alla visita e alle manovre assistenziali
- 0 Completa:** pressoché assente qualsiasi scambio comunicativo, anche con facilitazioni. Non adeguato all'interlocutore e assolutamente non collaborante alle manovre assistenziali

Patologie psichiatriche: No / Sì

Se sì, specificare

In carico a CPS: No / Sì

Se sì, specificare

Tentato suicidio: No / Sì

Se sì, specificare

Alterazioni del comportamento rilevanti

- Wandering
- Depressione
- Agitazione/aggressività
- Etilismo

Rientro al domicilio

Certo Probabile Attivata pratica RSA

Il paziente è affetto da demenza? No Sì se sì, la diagnosi risale a: < 3 mesi < 1 anno > 1 anno

Disturbi comportamentali e sintomi psichici? No Sì se sì, da quanto tempo: vari giorni mesi anni

Da compilare solo per profilo demenze

Disturbi comportamentali

- Deliri (persecutori, di gelosia, ecc.)
- Allucinazioni
- Vagabondaggio o si perde fuori casa
- Agitazione notturna
- Inversione ritmo sonno-veglia
- Aggressività verso sé e/o gli altri
- Urla o lamentazioni o vocalismi
- Negli ultimi 6 mesi sono stati usati mezzi di protezione fisica
- Presenza di disturbi del comportamento alimentare

Confusione

- Completamente confuso, personalità destrutturata
- Confuso e non si comporta in certe situazioni come dovrebbe
- Incerto e dubbioso, nonostante sia orientato nel tempo/spazio
- Pensa in modo chiaro, tiene normali contatti con l'ambiente

Irritabilità

- Qualsiasi contatto è causa di irritabilità
- Mostra ogni tanto segni di irritabilità,
- Non mostra segni di irritabilità

Irrequietezza

- Incapace di stare fermo, tocca gli oggetti a portata di mano
- Si agita e gesticola durante la conversazione
- Non mostra alcun segno di irrequietezza motoria

AREA SOCIALE CONDIZIONE SOCIALE

- 1 supporto sociale presente (vive in famiglia e i membri sono in grado di fornire il supporto necessario)
- 2 parziale supporto sociale (vive solo oppure in famiglia ma i famigliari, anche se presenti, non sono in grado di fornire tutto il supporto necessario)
- 3 assenza di supporto sociale (vive solo e non sono presenti figure di riferimento)

OBIETTIVI DEL RICOVERO (anche più di uno)

- stabilizzazione clinico assistenziale ("convalescenza" e monitoraggio funzioni vitali)
- recupero e miglioramento funzionale
- supporto e addestramento del care-giver (nursing riabilitativo e addestramento a device e/o ausili)
- valutazione e indirizzo alle cure di fine vita (prognosi poco favorevole e approccio palliativo)



Regione Lombardia

AREA ASSISTENZIALE: INDICE DI COMPLESSITA' ASSISTENZIALE (ICA)

1) FUNZIONE CARDIOCIRCOLATORIA		6) IGIENE ED ABBIGLIAMENTO																																																																		
<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1	<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
<input type="checkbox"/> Parametri <3 rilevazioni die	2	<input type="checkbox"/> Necessità aiuto solo per igiene completa (bagno o doccia)	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Parametri ≥3 rilevazioni die	3	<input type="checkbox"/> Necessità aiuto cura anche per cura igienica parziale/vestirsi	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Scompenso cardiaco classe NYHA 1-2	2	<input type="checkbox"/> Totale dipendenza /assenza di collaborazione	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Scompenso cardiaco classe NYHA 3	3	7) MOVIMENTO																																																																		
<input type="checkbox"/> Scompenso cardiaco classe NYHA 4	4	<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
<input type="checkbox"/> Peso corporeo giornaliero o plurisettimanale	3	<input type="checkbox"/> Utilizzo in modo autonomo presidi per movimento	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Quantità urine	2	<input type="checkbox"/> Necessità aiuto costante per la deambulazione	3																																																																	
2) FUNZIONE RESPIRATORIA		<input type="checkbox"/> Mobilizzazione in poltrona e/o cambi posizione nel letto	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1	<input type="checkbox"/> Necessità di utilizzare il sollevatore	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Difficoltà respiratoria da sforzo lieve-moderata	2	<input type="checkbox"/> Allattamento obbligato/immobilità nel letto	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Dispnea da sforzo grave	3	8) RIPOSO E SONNO																																																																		
<input type="checkbox"/> Dispnea a riposo	4	<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
<input type="checkbox"/> Secrezioni abbondanti da broncoaspirare	4	<input type="checkbox"/> Sonno indotto con farmaci	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Tosse acuta/cronica	3	<input type="checkbox"/> Disturbi del sonno	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Parametri <3 rilevazioni die	2	<input type="checkbox"/> Agitazione notturna costante	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Parametri ≥3 rilevazioni die	3	9) SENSORIO E COMUNICAZIONE																																																																		
<input type="checkbox"/> Ossigenoterapia	3	<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
<input type="checkbox"/> Necessità di ventiloterapia notturna	3	<input type="checkbox"/> Difficoltà in forma lieve: vista e/o udito e/o linguaggio	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Presenza di tracheostomia	4	<input type="checkbox"/> Difficoltà in forma grave: vista e/o udito e/o linguaggio	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Terapia con nebulizzazioni	3	<input type="checkbox"/> Deficit cognitivo lieve	2																																																																	
3) MEDICAZIONI		<input type="checkbox"/> Deficit cognitivo moderato	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Assenza di medicazioni	1	<input type="checkbox"/> Deficit cognitivo grave	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Lesione da pressione o ulcera (Stadio 1-2)	2	<input type="checkbox"/> Stato costante di apatia/agitazione/aggressività	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Lesione da pressione o ulcera (Stadio 3)	3	10) AMBIENTE SICURO/SITUAZIONE SOCIALE																																																																		
<input type="checkbox"/> Lesione da pressione o ulcera (Stadio 4 o sedi multiple)	4	<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																	
<input type="checkbox"/> Ferita chirurgica non complicata	2	<input type="checkbox"/> Apparecchi medicali dal domicilio	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Ferita chirurgica complicata (deiscenza, infezione)	3	<input type="checkbox"/> Rischio caduta medio-alta	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Moncone di amputazione da medicare	3	<input type="checkbox"/> Uso di mezzi di protezione	4																																																																	
<input type="checkbox"/> Ulcera da piede diabetico: ulcera vascolare, neuropatica	3	<input type="checkbox"/> Attivazione assistente sociale	3																																																																	
<input type="checkbox"/> Stomia recente da medicare	3	<input type="checkbox"/> Educazione sanitaria del care-giver	2																																																																	
<input type="checkbox"/> Altre medicazioni complesse o sedi multiple	4	<input type="checkbox"/> Pianificazione dimissioni con altre istituzioni	3																																																																	
4) ALIMENTI E IDRATAZIONE		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICE DI COMPLESSITA' ASSISTENZIALE</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Funzione cardiocircolatoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Funzione Respiratoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Medicazioni</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Alimentazione ed idratazione</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Eliminazione urinaria ed intestinale</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Igiene ed abbigliamento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Movimento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Riposo e sonno</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sensori e comunicazione</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ambiente sicuro/situazione sociale</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Esito di colonna maggiormente rappresentato</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>La Valutazione I.C.A. delinea il PROFILO</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>		INDICE DI COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	1	2	3	4	Funzione cardiocircolatoria					Funzione Respiratoria					Medicazioni					Alimentazione ed idratazione					Eliminazione urinaria ed intestinale					Igiene ed abbigliamento					Movimento					Riposo e sonno					Sensori e comunicazione					Ambiente sicuro/situazione sociale					Esito di colonna maggiormente rappresentato					La Valutazione I.C.A. delinea il PROFILO	1	2	3	4
INDICE DI COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	1			2	3	4																																																														
Funzione cardiocircolatoria																																																																				
Funzione Respiratoria																																																																				
Medicazioni																																																																				
Alimentazione ed idratazione																																																																				
Eliminazione urinaria ed intestinale																																																																				
Igiene ed abbigliamento																																																																				
Movimento																																																																				
Riposo e sonno																																																																				
Sensori e comunicazione																																																																				
Ambiente sicuro/situazione sociale																																																																				
Esito di colonna maggiormente rappresentato																																																																				
La Valutazione I.C.A. delinea il PROFILO	1	2	3	4																																																																
<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																			
<input type="checkbox"/> Prescrizione dietetica	2																																																																			
<input type="checkbox"/> Necessità di aiuto per azioni complesse	2																																																																			
<input type="checkbox"/> Necessità di aiuto costante nell'alimentarsi	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Presenza di disfagia lieve	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Presenza di disfagia moderata/severa	4																																																																			
<input type="checkbox"/> Nutrizione enterale (SNG o P EG recente)	3																																																																			
5) ELIMINAZIONE																																																																				
<input type="checkbox"/> Senza aiuto/sorveglianza	1																																																																			
<input type="checkbox"/> Monitoraggio alvo	2																																																																			
<input type="checkbox"/> Necessità di clisma	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Necessità di essere accompagnato al WC	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Gestione della stomia	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Presidi assorbenti solo di notte/pappagallo	2																																																																			
<input type="checkbox"/> Incontinenza fecale/urinaria (utilizzo di presidi assorbenti 24h/24h)	3																																																																			
<input type="checkbox"/> Cateterismo durante il ricovero /a lunga permanenza	3																																																																			

Nella scheda ICA compilare tutte le voci dei bisogni rilevati come significativi, nello schema riassuntivo utile a definire il Profilo riportare solo il valore dell'item prevalente. La colonna del numero più rappresentato delinea il Profilo Assistenziale del paziente (Profilo 1, 2, 3, 4)

Data di compilazione

Nome e firma dell'infermiere

Nome e firma del medico

.....

.....



Matrice per la determinazione del profilo di cura

Per ciascuna area sono individuati gli indicatori che permettono la collocazione dell'utente nel profilo corrispondente ai differenti bisogni rilevati nelle aree di assistenza, cura e riattivazione, attraverso il seguente processo decisionale:

1. la valutazione ICA consente una prima suddivisione degli utenti in due ambiti: profili 1 e 2 oppure profili 3 e 4;
2. il punteggio delle successive tre scale (SIC, Rankin e SDC) determina l'individuazione precisa del profilo: confrontando i valori ottenuti con le soglie previste dalla matrice di seguito riportata, viene individuato il profilo più elevato in cui, oltre alla scala ICA, sia verificata almeno una delle successive tre scale.

La classificazione nel profilo 5 – Demenze è determinata dalla presenza di disturbi attivi del comportamento in soggetti con diagnosi già definita di demenza, con manifestazioni che richiedono il ricovero in ambiente protetto.

Indicatore		Profilo 1	Profilo 2	Profilo 3	Profilo 4
<i>Tipo e intensità del bisogno rispetto le aree che determinano il profilo</i>		<i>Bassa complessità assistenziale e bassa intensività clinica</i>	<i>Media complessità assistenziale, bassa intensività clinica con necessità di recupero funzionale</i>	<i>Alta complessità assistenziale, media intensività clinica con necessità di recupero funzionale</i>	<i>Alta complessità assistenziale e alta intensività clinica, con necessità di elevato recupero funzionale</i>
1	Indice di complessità assistenziale (10 Item) I.C.A.	ICA 1-2	ICA 1-2	ICA 3-4	ICA 3-4
2	Instabilità clinica (Scala Instabilità Clinica –SIC)	Bassa instabilità (SIC < 3)	Bassa instabilità (SIC < 3)	Alta instabilità (SIC = 3)	Alta instabilità (SIC = 3)
	Rankin pre-evento (dipendenza pre evento)	Alta dipendenza (Rankin ≥ 3)	Bassa dipendenza (Rankin ≤ 2)	Alta dipendenza (Rankin ≥ 3)	Bassa dipendenza (Rankin ≤ 2)
	Scala Disabilità Comunicativa- SDC	Alta disabilità	Bassa disabilità	Alta disabilità	Bassa disabilità